

NUEVAS MEDIDAS COVID HASTA 15 FEBRERO 2021


En vigor a partir del lunes, 25 de enero, y hasta el 15 de febrero

Nuevas Medidas COVID-19



<p>Encuentros sociales o familiares dentro de casas</p> <p>Quedan limitados al mismo núcleo de convivencia</p>	<p>Espacios públicos: cerrados o al aire libre</p> <p>Los encuentros familiares o sociales quedan limitados a un máximo de 2 personas, salvo que se trate de convivientes</p>	<p>Perimetración de municipios de más de 50.000 habitantes</p> <p>Durante el fin de semana y los días festivos se confinarán perimetralmente los siguientes municipios</p> <p>València / Alicante / Elx / Castelló de la Plana / Torrevieja / Torrent / Orihuela / Gandía / Paterna / Benidorm / Sagunt / Alcoi / Sant Vicent del Raspeig / Elda - Petrer / y Vila-real</p>
<p>Confinamiento perimetral del territorio valenciano</p> <p>Únicamente se autorizarán los desplazamientos adecuadamente justificados</p>	<p>Sigue en vigor el cierre de la hostelería, el cierre de comercios a las 18 h, el confinamiento nocturno a partir de las 22 h y el cierre de instalaciones deportivas</p>	



¿Qué test o pruebas para COVID-19 existen y para qué sirve cada uno?



Existen diferentes tipos de test y cada uno tiene una utilidad diferente.

¿Tengo la infección ahora mismo?

Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA)

-  Si es **positiva** indica infección activa.
-  Si es **negativa** puede ser que no haya infección o que se esté en periodo de incubación.

Prueba PCR

Es la prueba de mayor fiabilidad

Prueba rápida de antígenos

Se obtiene el resultado en 15-20 minutos


Se realizan tomando la muestra con un bastoncillo que se introduce en las fosas nasales y/o en la garganta. Para más información:

<http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/pruebaCovid19.pdf>

¿He tenido contacto con el virus?

Pruebas de anticuerpos

La presencia de anticuerpos puede indicar que se ha tenido contacto con el SARS-CoV-2

 La IgG positiva no garantiza inmunidad

 La IgM positiva no siempre significa infección activa.

La detección de anticuerpos no se considera una prueba válida para el diagnóstico de la infección y su interpretación es compleja por lo que se desaconseja su realización

Prueba en laboratorio (ELISA, CLIA)

Punción en vena

Test rápidos o de auto-diagnóstico

Pinchazo en dedo

Se realizan tomando muestra de sangre

EN NINGÚN CASO SIRVEN PARA RELAJAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN